



PROYECTO DE PROSPECTO PARA EL USUARIO

“PANTOPRAZOL TEVA “
PANTOPRAZOL 20 mg
Comprimidos recubiertos gastrorresistentes
VIA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL

Industria Española

Venta Libre

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO, este prospecto contiene información que puede serle útil para volver a leer.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aparece cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, **CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO INMEDIATAMENTE**

¿QUÉ CONTIENE PANTOPRAZOL TEVA?

Cada comprimido recubierto gastrorresistente contiene:

Pantoprazol sódico (equivalente a 20 mg de Pantoprazol) 22,55 mg

Excipientes: Celulosa microcristalina, croscarmelosa sódica, estearato de magnesio, fosfato sódico dibásico anhidro, manitol, hidroxipropilmetilcelulosa, citrato de trietilo, carboximetilalmidón sódico tipo A, copolímero de ácido metacrílico y acrilato de etilo (1:1), óxido de hierro amarillo c.s.

ACCIÓN: Reduce la producción de ácido estomacal

¿PARA QUÉ SE UTILIZA PANTOPRAZOL TEVA?

Se utiliza para el alivio a corto plazo de los síntomas de ardor / acidez o regurgitación ácida (reflujo) en adultos mayores de 18 años.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR PANTOPRAZOL TEVA?

No debe utilizar este medicamento si:

- No tome este medicamento si Ud. tiene alergia conocida a alguno de los componentes de la fórmula
- No debe administrarse en menores de 18 años de edad
- No debe utilizar quien padezca de acidez ocasional ni para el alivio inmediato de la acidez
- No debe utilizar si Ud. Presenta acidez con mareos o transpiración

¿QUE CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE TOMAR PANTOPRAZOL TEVA?

Si Ud. tiene:

- Dificultad o dolor al tragar la comida
- Vómitos reiterados, aparición de sangre en el vómito o en las deposiciones



- Diarrea prolongada o que no mejora
- Acidez desde hace más de tres meses;
- Acidez con mareos o transpiración;
- Dolor de pecho u hombros con dificultad para respirar, dolor que se propaga a brazos y cuello
- Dolor de pecho frecuente;
- Dificultad para respirar, particularmente acompañada de acidez;
- Pérdida de peso inexplicable;
- Dolor de estómago, náuseas o vómitos
- Trastornos renales y/o hepáticos
- Si toma durante períodos más largos, es posible que se produzcan riesgos adicionales como: disminución de los niveles de magnesio en sangre (síntomas posibles: fatiga, contracciones musculares involuntarias, desorientación, convulsiones, mareo, aumento del ritmo cardíaco). Además, niveles bajos de magnesio pueden producir una disminución de los niveles de potasio y calcio en sangre.
- Debe consultar a su médico si ha estado tomando este medicamento durante más de 4 semanas. Su médico decidirá realizar análisis de sangre periódicos para controlar los niveles de magnesio.

Si Ud. está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBE TENER MIENTRAS ESTÁ TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento como:

- Dolor de cabeza, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, constipación, meteorismo (gases), somnolencia, insomnio, sensación de hormigueo, trastornos renales.
- Erupción cutánea, especialmente en zonas de la piel expuestas al sol
- No se debe tomar PANTOPRAZOL TEVA como medicación preventiva

Debe consultar a su médico si Ud. toma al mismo tiempo otros medicamentos como:

- Ketoconazol, Itraconazol (medicamentos contra las infecciones producidas por hongos);



- Warfarina o clopidogrel (medicamentos utilizados como anticoagulantes);
- Diazepam (medicamento sedante)
- Digoxina (medicamento para el corazón)
- Teofilina (medicamento broncodilatador)
- Tacrolimus o ciclosporina (medicamentos inmunosupresores)
- Antirretrovirales tales como: nelfinavir, atazanavir (medicación para la infección VIH-SIDA)
- Fenitoína (medicamento antiepiléptico)

Ya que los medicamentos mencionados pueden interferir con el Pantoprazol.

¿CÓMO SE USA PANTOPRAZOL TEVA?

Es de administración vía oral en adultos mayores de 18 años.

Tome un comprimido recubierto gastrorresistente con un vaso de agua antes de desayunar, por la mañana, todos los días durante 14 días.

No rompa ni mastique el comprimido recubierto gastrorresistente.

No exceda la dosis de un comprimido diario sin consultar con su médico.

No tome por más de 14 días sin consulta médica

Si sus síntomas de ardor, acidez o regurgitación empeoran o no mejoran después de tomar este medicamento durante 14 días seguidos, debe consultar a un médico.

El uso prolongado puede producir otros efectos adversos importantes.

Menores de 18 años de edad deben consultar con su médico antes de tomar este medicamento.

¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Si usted ha tomado más comprimidos de la dosis recetada, contacte a su médico o vaya al hospital inmediatamente. Recuerde que debe tener la caja con usted para que quede claro qué medicamentos ha tomado. También puede comunicarse a los centros de Toxicología: Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: 0800 444 8694 / (011) 4962-6666/2247; Hospital Posadas: (01) 4654-6648 / 4658-7777"; Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández: (011) 4808-2655 / 4801-7767



Comunicación de efectos adversos

Si experimentas cualquier posible efecto adverso, ya sea que aparezca o no en el prospecto, consultá a tu médico.

Te alentamos a comunicar las reacciones adversas al laboratorio IVAX Argentina S.A., miembro del Grupo Teva, a través del 0800-666-3342 o de Safety.Argentina@teva.com.ar. También, podés comunicarte con el Sistema Nacional de Farmacovigilancia llamando al (+54-11) 4340-0866 o ingresando a <https://www.argentina.gob.ar/anmat/farmacovigilancia>.

Ante cualquier inconveniente con el producto usted puede llenar la ficha que está en la página web de la ANMAT:

<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp> ó llamar a ANMAT responde 0-800-333-1234

¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Comuníquese a los siguientes teléfonos:

Laboratorio IVAX Argentina S.A. al 0800-666-3342

ANMAT Responde: 0800 333 1234

MANTENGA LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO

FORMA DE CONSERVACIÓN

Conservar en su envase original a temperatura no mayor de 30° C.

No utilice el producto después de la fecha de vencimiento que se indica en el empaque.

PRESENTACIONES

Envase conteniendo 14 comprimidos recubiertos gastrorresistentes.

Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N° 58.393
Elaborado en: Teva Pharma, S.L.U. - Polígono Industrial Malpica, calle C, número 4, 50016 Zaragoza, España.

Importado y comercializado por: IVAX Argentina S.A.- Juan José Castelli N°6701 – Villa Adelina, Buenos Aires, Argentina

Directora Técnica: Rosana B. Colombo (Farmacéutica)

Para más información contactarse al 0800-666-3342

www.teva.com.ar



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2024-62956754 prospectos

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 4 pagina/s.