



PROSPECTO PARA EL USUARIO

Industria Argentina

Venta Libre

ESOGASTROSEDOL 20

ESOMEPRAZOL

Cápsulas con microgránulos gastrorresistentes

Vía oral

Lea con cuidado esta información antes de tomar el medicamento.

Conserve este prospecto dado que contiene información que puede serle útil para volver a leer.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aparece cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, consulte a su médico y/o farmacéutico.

¿QUÉ CONTIENE ESGASTROSEDOL 20?

Cada cápsula con microgránulos gastrorresistentes contiene:

Ingrediente activo: Esomeprazol (como Esomeprazol Magnesio Dihidrato) 20,0 mg.

Ingredientes inactivos: Esferas de azúcar; Polivinilpirrolidona K90; Carbonato de magnesio pesado; Dióxido de titanio; Copolímero del ácido Metacrílico tipo C; Triglicéridos de cadena media; Estearato de magnesio.

ACCIÓN:

ESOGASTROSEDOL 20 reduce la producción de ácido estomacal.



¿PARA QUÉ SE USA ESOMEPRAZOL 20?

ESOGASTROSEDOL 20 se utiliza para el alivio, a corto plazo, de los síntomas de ardor / acidez o regurgitación ácida (reflujo), en adultos mayores de 18 años.

¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR ESOMEPRAZOL 20?

No tome este medicamento si Ud. tiene alergia conocida al esogastroседol o a alguno de los ingredientes de este medicamento.

No administrar en menores de 18 años de edad.

No debe utilizar para tratar la acidez estomacal ocasional, ni en aquellas personas que necesiten un alivio inmediato de la acidez.

No debe utilizar si Ud. presenta acidez con mareos o transpiración.

¿QUÉ CUIDADOS DEBE TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?

Consulte con su médico si:

- Tiene dificultad o dolor al tragar la comida.
- Tiene vómitos reiterados, aparición de sangre en el vómito o en las deposiciones.
- Tiene diarrea prolongada o que no mejora.
- Acidez desde hace más de tres meses.
- Acidez con mareos o transpiración.
- Dolor de pecho u hombros con dificultad para respirar, dolor que se propaga a brazos y cuello.
- Dificultad para respirar, particularmente acompañada de acidez.
- Pérdida de peso inexplicable.
- Dolor de estómago, náuseas o vómitos.
- Trastornos renales y/o hepático.

Dado que los síntomas mencionados pueden deberse a una condición clínica seria, que requiera diagnóstico y tratamiento médico.



Si toma durante períodos más largos, es posible que se produzcan riesgos adicionales como: disminución de los niveles de magnesio en sangre (síntomas posibles: fatiga, contracciones musculares involuntarias, desorientación, convulsiones, mareo, aumento del ritmo cardíaco). Además, niveles bajos de magnesio pueden producir una disminución de los niveles de potasio y calcio en sangre.

Debe consultar a su médico si ha estado tomando este medicamento durante más de 4 semanas. Su médico decidirá realizar análisis de sangre periódicos para controlar los niveles de magnesio.

Si Ud. recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebe, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.

¿QUÉ CUIDADOS DEBE TENER MIENTRAS ESTÁ TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento como:

- Dolor de cabeza, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, constipación, meteorismo (gases), somnolencia, insomnio, sensación de hormigueo, trastornos renales.
- Erupción cutánea, especialmente en zonas de la piel expuestas al sol, consulte a su médico, ya que puede ser necesario suspender la toma del medicamento.

Debe consultar a su médico si Ud. toma al mismo tiempo otros medicamentos como:

- Naproxeno asociado a Esomeprazol puede provocar trastornos renales graves (nefritis tubulointerstitial aguda que puede evolucionar a insuficiencia renal).
- Ketoconazol, Itraconazol (medicamentos contra las infecciones producidas por hongos);
- Warfarina o Clopidogrel (medicamentos utilizados como anticoagulantes);
- Diazepam (medicamento sedante)



- Digoxina (medicamento para el corazón)
- Teofilina (medicamento broncodilatador)
- Tacrolimus o ciclosporina (medicamentos inmunosupresores)
- Antirretrovirales tales como Nelfinavir, Atazanavir (medicamento para la infección VIH-SIDA)
- Fenitoína (medicamento antiepiléptico).

Ya que los medicamentos mencionados pueden interferir con el Esomeprazol.

¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

ESOGASTROSEDOL 20 es de administración oral, en adultos mayores de 18 años.

Tome una cápsula con un vaso de agua antes de desayunar, por la mañana, una vez al día.

Las cápsulas de ESOGASTROSEDOL 20 se deben ingerir enteras, al menos una hora antes de las comidas.

No exceda la dosis de una cápsula por día sin consultar a su médico.

No tome por más de 14 días sin consulta médica.

Si sus síntomas de reflujo empeoran o no mejoran después de tomar este medicamento durante 14 días seguidos, debe consultar a un médico.

Si los síntomas de ardor, acidez o regurgitación ácida (reflujo) empeoran o no mejoran después de tomar este medicamento durante 14 días seguidos, debe consultar a un médico.

No se debe tomar esomeprazol como medicación preventiva.

El uso prolongado puede producir otros efectos adversos importantes.



¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN CONCURRIR AL HOSPITAL MAS CERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: 0800 444 8694 / (011) 4962-6666 / 2247

Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777

Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández: (011) 4808-2655 / 4801-7767

Optativamente otros centros de intoxicaciones.

¿TIENE UD. ALGUNA PREGUNTA?

Comuníquese a la línea gratuita de atención al consumidor:

0 810 333 5431

O, en caso necesario, al teléfono de ANMAT RESPONDE:

0800 333 1234.

PRESENTACIONES.

Envases conteniendo 7, 10, 15, 50 y 100 cápsulas con microgránulos gastrorresistentes, siendo estas dos últimas presentaciones de uso exclusivo hospitalario.

CONSERVAR EN LUGAR SECO A TEMPERATURA INFERIOR A 30°C

Fecha de vencimiento:

Nº de Lote:



Elaboración completa:

José E. Rodó 6424 – C1440AKJ – Capital Federal y/o Alvaro Barros 1113 – Luis Guillón – Pcia de Buenos Aires

Elaboración de microgránulos:

Polo Industrial Ezeiza, Puente del Inca N° 2450, esquina Canelones, Lote 31, Ciudad de Tristán Suárez, Partido de Ezeiza, Pcia. de Buenos Aires.

Elaboración de microgránulos y encapsulado:

Ingeniero Di Tella 936/68 y Av. Rivadavia 953, Localidad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires.

SIEGFRIED S.A.

Información a profesionales y usuarios ☎ 0810-333-5431

Carlos Calvo 2756, C1230AAT - CABA

www.siegfried.com.ar

Directora Técnica: María Eugenia Belgiorno - Farmacéutica

“MEDICAMENTO AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN”

CERTIFICADO N°: 54.608

IMPORTANTE:

“Mantener fuera del alcance de los niños”.

“Ante cualquier duda, consulte con su médico y/o farmacéutico”.

“No utilizar luego de la fecha de vencimiento indicada en el envase”



BELGIORNO María Eugenia
CUIL 27182795920



D'ANGELO Jorgelina
CUIL 27216990663



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número:

Referencia: EX-2024-75909305- SIEGFRIED - Prospectos - Certificado N54.608

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 6 pagina/s.