

## PROSPECTO PARA EL USUARIO

### **XICLOVIR® ACICLOVIR 5%**

Crema

Ungüento dérmico

VIA DE ADMINISTRACIÓN: TÓPICA

Venta libre

Industria Argentina

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO, porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas, aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico o farmacéutico incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

### **¿Qué contiene XICLOVIR?**

Cada 100 g de crema contiene:

Aciclovir 5,000 g; Cera autoemulsionable 8,000 g; Propilenglicol 40,000 g; Vaselina líquida 10,000 g; Polisorbato 80 0,500 g; Vaselina sólida 4,000 g; Agua purificada c.s.p.100,000 g

Cada 100 g de ungüento dérmico contiene:

Aciclovir 5,00 g; Polietilenglicol 400 50,00 g; Polietilenglicol 1500 20,00 g; Glicerina 25,00 g.

**Acción:** Antiviral de uso tópico y acción local.

### **¿Para qué se usa?**

Se usa para el alivio de los síntomas de recurrencia de herpes simple labial (herpes que ya se ha presentado anteriormente), de poca extensión (no más de 1 cm<sup>2</sup>) con contenido cristalino (vesícula) en mayores de 12 años y adultos.

### **¿Qué personas no pueden recibir XICLOVIR?**

No use este medicamento si Ud. sabe que es alérgico (hipersensible) a alguno de los componentes de la fórmula.

No use en menores de 12 años.

**Si Ud. Está tomando algún medicamento, o está embarazada o dando el pecho a su bebe, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento.**

	
<b>DANIELA A. CASAS</b> FARMACÉUTICA DIRECTORA TÉCNICA	<b>ELENA RUT ZIFFER</b> APODERADA

## ¿Qué cuidados debe tener antes de utilizar?

Si está en contacto con niños, amamantando o embarazada.

Si es la primera vez que padece herpes en ese sitio o tiene más de uno a la vez.

Si el herpes recurre más de 5 veces al año.

Si el herpes contiene pus, sangre, costra.

Si presenta otros síntomas: brotes en la piel, fiebre, ganglios aumentados de tamaño o la lesión no duele.

Si se encuentra bajo tratamiento por otra enfermedad.

Si está inmunocomprometido (bajo de defensas) por ejemplo padece HIV, es trasplantado, recibe radioterapia, quimioterapia o corticoides.

No sobrepase la frecuencia de aplicaciones ni la duración del tratamiento recomendado.

## ¿Qué cuidados debe tener mientras está utilizando?

Deberá interrumpir el uso de este producto y consultar inmediatamente a su médico si presenta: Enrojecimiento, picazón, sequedad o descamación de la piel en la zona de aplicación.

Reacciones alérgicas como edemas de labios, cara o párpados.

## ¿Cómo se usa?

Para uso externo exclusivo en labio.

Inicie la aplicación tempranamente, cuando comienzan los síntomas (ardor, picazón, dolor).

Lave su mano antes y después de aplicar. Aplique una capa delgada que cubra el área de la lesión. Repita la dosis 5 veces al día. Úselo hasta 7 días consecutivos.

SI EL HERPES NO CURA O EMPEORA A PESAR DE APLICAR LA CREMA CONSULTE AL MÉDICO.

## ¿Qué debo hacer ante una sobredosis, o si coloqué más cantidad de la necesaria?

Ante la eventualidad de una ingesta accidental o sobredosificación concurrir al hospital más cercano o

comunicarse con los Centros de Toxicología:

• Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez, Tel. (011) 4962-6666/2247;

• Hospital de Niños Pedro de Elizalde, Tel. (011) 4307-4788/5442;

• Hospital A. Posadas, Tel. (011) 4654-6648/4658-7777.

Optativamente otros centros de intoxicaciones.

## ¿Tiene ud. Alguna pregunta?

Comuníquese a los siguientes teléfonos:

ANMAT Responde: 0800 333 1234

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE A SU MÉDICO Y/O FARMACÉUTICO



**DANIELA A. CASAS**  
FARMACÉUTICA  
DIRECTORA TÉCNICA

**ELENA RUT ZIFFER**  
APODERADA

# LAZAR

## PRESENTACIONES.

Envases conteniendo: 3 g, 5 g, 7,5 g y 10 g.

"Mantener este y cualquier otro medicamento fuera del alcance de los niños".

## Formas de conservación:

Mantener lejos del calor y la luz solar directa. Conservar a una temperatura entre 15 y 30 °C.

Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud.  
Certificado N° 39.482

Dr. LAZAR y Cía S.A.Q. e I.  
Av. Vélez Sarsfield 5853/5855  
B1605EPI Munro, Pcia. de Buenos Aires  
Directora Técnica: Daniela A. Casas, Farmacéutica y Bioquímica.

Fecha de aprobación de la información para el usuario: .....



DANIELA A. CASAS  
FARMACÉUTICA  
DIRECTORA TÉCNICA



ELENA RUT ZIFFER  
APODERADA



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2024-88802975- DR. LAZAR - Aciclovir prospectos - Certificado 39.482

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.