

**PROSPECTO PARA EL USUARIO**

**ESOMEPRAZOL RICHEL  
ESOMEPRAZOL**

**20 mg**

**CÁPSULAS DE LIBERACION MODIFICADA**

**Venta libre**

**Industria Argentina**

LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACIÓN ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO, Conserve este prospecto dado que contiene información que puede serle útil para volver a leer.

Si considera que alguno de los efectos adversos que sufre es grave o si aparece cualquier efecto adverso no mencionado en este prospecto, consulte a su médico y/o farmacéutico.

**¿QUÉ CONTIENE?**

ESOMEPRAZOL RICHEL 20 mg

**Cada cápsula de liberación modificada contiene:**

Esomeprazol Magnésico Trihidrato ...	22,21 mg
(Equivalentes a Esomeprazol 20 mg) Azúcar.....	30,64 mg
Hidroxipropilmetilcelulosa E15 .....	9,50 mg
Polisorbato 80 .....	1,25 mg
Talco.....	6,20 mg
Trietilcitrate .....	3,95 mg
Eudragit L30 D55.....	26,25 mg

**ACCIÓN:**

Reduce la producción de ácido estomacal.

## **¿PARA QUÉ SE USA ESOMEPRAZOL?**

Se utiliza para el alivio a corto plazo de los síntomas de ardor / acidez o regurgitación ácida (reflujo) en adultos mayores de 18 años.

## **¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR ESOMEPRAZOL?**

No tome este medicamento si Ud. tiene alergia conocida a alguno de los componentes de la fórmula.

No administrar en menores de 18 años de edad.

No debe utilizar quien padezca de acidez ocasional ni aquellas personas que necesiten un alivio inmediato de la acidez.

No debe utilizar si Ud. presenta acidez con mareos o transpiración.

## **¿QUÉ CUIDADOS DEBE TENER ANTES DE TOMAR ESTE MEDICAMENTO?**

Consulte con su médico si:

- tiene dificultad o dolor al tragar la comida
- tiene vómitos reiterados, aparición de sangre en el vómito o en las deposiciones
- tiene diarrea prolongada o que no mejora
- acidez desde hace más de tres meses;
- acidez con mareos o transpiración;
- dolor de pecho u hombros con dificultad para respirar, dolor que se propaga a brazos y cuello,
- dificultad para respirar, particularmente acompañada de acidez;
- pérdida de peso inexplicable;
- dolor de estómago, náuseas o vómitos
- trastornos renales y/o hepático.

Dado que los síntomas mencionados pueden deberse a una condición clínica seria, que requiera diagnóstico y tratamiento médico.

Si toma durante períodos más largos, es posible que se produzcan riesgos adicionales como: disminución de los niveles de magnesio en sangre (síntomas posibles: fatiga, contracciones musculares involuntarias, desorientación, convulsiones, mareo, aumento del ritmo cardíaco). Además, niveles bajos de magnesio pueden producir una disminución de los niveles de potasio y calcio en sangre.

Debe consultar a su médico si ha estado tomando este medicamento durante más de 4 semanas. Su médico decidirá realizar análisis de sangre periódicos para controlar los niveles de magnesio.

**Si Ud. recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebe, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.**

### **¿QUÉ CUIDADOS DEBE TENER MIENTRAS ESTÁ TOMANDO ESTE MEDICAMENTO?**

Pueden aparecer efectos no deseados causados por el medicamento como:

-dolor de cabeza, diarrea, náuseas, vómitos, dolor abdominal, constipación, meteorismo (gases), somnolencia, insomnio, sensación de hormigueo, trastornos renales.

-erupción cutánea, especialmente en zonas de la piel expuestas al sol, consulte a su médico, ya que puede ser necesario suspender la toma del medicamento.

Debe consultar a su médico si Ud. toma al mismo tiempo otros medicamentos como:

- Naproxeno asociado a Esomeprazol puede provocar trastornos renales graves (nefritis tubulointersticial aguda que puede evolucionar a insuficiencia renal).
- Ketoconazol, Itraconazol (medicamentos contra las infecciones producidas por hongos);
- Warfarina o Clopidogrel (medicamentos utilizados como anticoagulantes);
- Diazepam (medicamento sedante)
- Digoxina (medicamento para el corazón)
- Teofilina (medicamento broncodilatador)
- Tacrolimus o ciclosporina (medicamentos inmunosupresores)
- Antirretrovirales tales como Nelfinavir, Atazanavir (medicamento para la infección VIH-SIDA)
- Fenitoína (medicamento antiepiléptico).

Ya que los medicamentos mencionados pueden interferir con el Esomeprazol.

### **¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?**

**Es de administración oral en adultos mayores de 18 años.**

Tome un comprimido y/o cápsula con un vaso de agua antes de desayunar, por la mañana, todos los días durante 14 días.

No rompa ni mastique las cápsulas.

No exceda la dosis de un comprimido diario sin consultar a su médico.

**No tome por más de 14 días sin consulta médica.**

Si sus síntomas de reflujo empeoran o no mejoran después de tomar este medicamento durante 14 días seguidos, debe consultar a un médico.

**Si los síntomas de ardor, acidez o regurgitación ácida (reflujo) empeoran o no mejoran después de tomar este medicamento durante 14 días seguidos, debe consultar a un médico.**

No se debe tomar esomeprazol como medicación preventiva.

El uso prolongado puede producir otros efectos adversos importantes.

### **¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI TOMÉ MÁS CANTIDAD DE LA ¿NECESARIA?**

ANTE LA EVENTUALIDAD DE UNA SOBREDOSIFICACIÓN CONCURRIR AL HOSPITAL MAS CERCANO O COMUNICARSE CON LOS CENTROS DE TOXICOLOGÍA

Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: 0800 444 8694 / (011) 4962-6666 / 2247

Hospital Nacional Prof. Alejandro Posadas: (011) 4654-6648 / 4658-7777

Hospital Gral. de Agudos Juan A. Fernández: (011) 4808-2655 / 4801-7767

Optativamente otros centros de intoxicaciones.

### **¿TIENE UD. ALGUNA PREGUNTA?**

Comuníquese a los siguientes teléfonos:

ANMAT Responde: 0800 333 1234

**Presentaciones**

**Unidad para venta al público:**

Estuche x14 cápsulas (conteniendo 2 blisters x 7 cápsulas c/u.)

**Unidad Dispenser:**

Caja x 252 cápsulas (conteniendo 36 blisters x 7 cápsulas c/u)

Caja x 350 cápsulas (conteniendo 35 blisters x 10 cápsulas c/u)

**Unidad Uso Hospitalario Exclusivo:**

Caja x 252 cápsulas (conteniendo 36 blisters x 7 cápsulas c/u)

Caja x 500 cápsulas (conteniendo 50 blisters x 10 cápsulas c/u)

Caja x 1000 cápsulas (conteniendo 100 blisters x 10 cápsulas c/u)

**MANTENER LOS MEDICAMENTOS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**

**Especialidad medicinal autorizada por el Ministerio de Salud. Certificado N°  
56370**

**Información a profesionales y usuarios: 0800-777-2924**

**Fecha de última revisión del prospecto autorizado por el ANMAT: 02/10/2017**

Director técnico: MARCOS A. PAIRETTI – Farmacéutico  
LABORATORIOS RICHEL S.A.

**Elaborado en: Tres Arroyos N° 1819/25/29/39**  
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires. C1416BMC Teléfono:  
5129-5555 - E-mail: dirtec@richet.com

Firmado digitalmente por:  
MIKULSKY Lidia Cristina  
Fecha y hora: 26/02/2025 13:07:44

Firmado digitalmente por:  
PAIRETTI Marcos Ariel  
Fecha y hora: 26/02/2025 15:30:52



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Anexo**

**Número:**

**Referencia:** EX-2025-03385250- RICHT - Prospectos - Certificado N56.370

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 5 pagina/s.